

Bivinadol

Viên nén sủi bọt

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén sủi bọt chứa Paracetamol 500 mg và các tá dược gồm: Povidon, natri bicarbonat, effer soda, acid citric khan, acid tartaric, propylen glycol, polysorbat 80, natri benzoat, polyethylen glycol, đường trắng, manitol, saccharin natri, aspartam, hương chanh, ethanol 96%.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén sủi bọt.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 4 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 4 viên, hộp 1 tuýp x 10 viên.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Điều trị các chứng đau cấp tính và mạn tính như: Đau đầu, đau răng, đau bụng kinh, đau thần kinh, đau khớp và đau cơ.

Hạ sốt ở bệnh nhân bị cảm hay những bệnh có liên quan tới sốt.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 – 2 viên, mỗi 4 – 6 giờ (đến tối đa 4 g/ngày).

- Trẻ em từ 6 – 12 tuổi: ½ - 1 viên, mỗi 4 – 6 giờ tùy theo tuổi (tối đa 4 lần ngày khi cần).

Không dùng quá 10 ngày cho người lớn và 5 ngày cho trẻ em mà không có hướng dẫn của thầy thuốc.

Cách dùng: Hòa tan viên thuốc sủi bọt vào 1 ly nước trước khi uống. Công thức viên sủi bọt thường có tác dụng nhanh và khi hòa tan trong nước sẽ cho một dung dịch trong và mùi vị dễ uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với Paracetamol hay với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người bệnh thiếu hụt Glucose-6-phosphat dehydrogenase.
- Người bệnh nhiều lần thiếu máu hay có bệnh tim, thận hoặc gan.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Thuốc nên được dùng thận trọng ở người suy chức năng gan và thận nặng.
- Cần theo dõi chức năng thận khi sử dụng dài ngày hoặc bị suy thận.
- Tránh uống rượu trong thời gian dùng thuốc.
- Thận trọng đối với các bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng hoặc hạn chế muối, cần cân nhắc đến lượng muối trong khẩu phần hàng ngày vì trong mỗi viên thuốc có chứa khoảng 0,24 g muối natri.
- Thận trọng đối với các bệnh nhân đái tháo đường, vì mỗi viên thuốc có chứa khoảng 0,1 g đường.
- Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven – Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Uống dài ngày liều cao Paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống

đông của Coumarin và dẫn chất Indandion.

- Thuốc chống co giật (Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin) có thể làm tăng tính độc gan của Paracetamol do tăng chuyển hóa thành các chất độc hại.

- Dùng đồng thời Isoniazid với Paracetamol cũng có thể làm tăng nguy cơ độc hại gan.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Các nghiên cứu trên người và động vật chưa xác định được nguy cơ gì của Paracetamol đối với thai kỳ hoặc sự phát triển của phôi thai. Nghiên cứu ở người mẹ dùng Paracetamol sau khi sinh cho con bú, không thấy có tác dụng không mong muốn nào ở trẻ nhỏ bú mẹ.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây ảnh hưởng gì trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Các triệu chứng quá liều Paracetamol bao gồm: Tái nhợt, buồn nôn, nôn, chán ăn và đau bụng. Tổn thương gan có thể biểu hiện rõ 12 - 48 giờ sau khi uống thuốc. Trong trường hợp ngộ độc tổn thương gan nặng, có thể tiến triển thành bệnh não, hôn mê và tử vong.

Xử trí: Cần rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống thuốc.

Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất Sulfhydryl, N-acetylcystein. Nếu không có N-acetylcystein, có thể dùng Methionin. Ngoài ra than hoạt hoặc thuốc xổ muối cũng có khả năng làm giảm hấp thu Paracetamol.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Tác dụng phụ thường rất nhẹ: Đôi khi bị mẩn da, buồn nôn, nôn. Khi lạm dụng dài ngày có thể gây độc tính trên thận.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

WHO-GMP

TOA BIVINADOL VIEN SUI 21-B

BRV
RV Group co.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH BRV HEALTHCARE

Địa chỉ: Khu A, số 18, đường số 09, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.