

Hướng dẫn sử dụng thuốc

# <sup>®</sup> THUỐC HEN PHÚC HƯNG

**ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ HEN PHẾ QUẢN MẠN TÍNH  
PHÒNG NGỪA CƠN HEN TÁI PHÁT**

**Thành phần dược chất:** Mỗi lọ chứa 250ml cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 266,5g dược liệu đã qua chế biến gồm:

Tô tử ( <i>Fructus Perillae frutescensis</i> ).....	40g
Bán hạ nam chế ( <i>Rhizoma Typhonii trilobati preparata</i> ).....	34g
Cam thảo ( <i>Radix et Rhizoma Glycyrrhizae</i> ).....	17g
Quế ( <i>Cortex Cinnamomi</i> ).....	8,5g
Tiền hồ ( <i>Radix Peucedani</i> ).....	34g
Trần bì ( <i>Pericarpium Citri reticulatae</i> ).....	28g
Hậu phác ( <i>Cortex Magnoliae officinalis</i> ).....	14g
Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> ).....	40g
Lá táo ( <i>Folium Ziziphus mauritiana</i> ).....	34g
Sinh khương ( <i>Rhizoma Zingiberis recens</i> ).....	17g
Tá dược: Natri benzoat, đường kính, nước tinh khiết.....	vđ 250ml

**Dạng bào chế:** Cao lỏng.

**Quy cách đóng gói:** Hộp 1 lọ x 250ml

- Y học cổ truyền có ưu thế điều trị các bệnh mãn tính, trong đó có bệnh hen phế quản, do tập trung điều trị căn nguyên sinh bệnh.
- Sản phẩm Thuốc hen Phúc Hưng được bào chế theo bài thuốc cổ phương gia giảm, chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược, có tác dụng điều hoà công năng của ba tạng Tỳ - Phế - Thận, giúp cải thiện triệu chứng, bệnh thuyên giảm dần dần, ổn định và ít tái phát.
- Sau khi dùng thuốc 4 tuần, bệnh nhân sẽ thấy cơn hen thưa và nhẹ dần, đờm loãng, tống xuất ra ngoài, phổi thông thoáng và dễ thở hơn.

**Tác dụng:**

Giáng khí, bình suyễn, ôn hóa đàm thấp.

**Chỉ định:**

- Hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, bệnh tâm phế mãn.
- Các trường hợp ho suyễn, tức ngực, đờm nhiều, khó thở.
- Phòng ngừa cơn hen tái phát.

**Cách dùng, liều dùng:**

Ngày uống 2 lần, sau bữa ăn.

Trẻ dưới 6 tuổi: mỗi lần 10ml.

Trẻ từ 6 - 14 tuổi: mỗi lần 20ml.

Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn: mỗi lần 30ml.

Đợt điều trị 8 - 10 tuần. Trường hợp bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên.

Trong quá trình dùng Thuốc hen Phúc Hưng, nếu lên cơn khó thở, có thể phối hợp với các phương pháp chữa trị của y học hiện đại để làm hết cơn.

**Lưu ý khi dùng thuốc:**

- Sau khi kết thúc đợt điều trị, đa số bệnh nhân không còn lên cơn hen. Trường hợp bệnh nặng, bệnh nhân có thể điều trị thêm 2 - 3 đợt nữa tùy theo tình trạng bệnh.
- Thời gian điều trị ban đầu bằng Thuốc hen Phúc Hưng, một số trường hợp ho có thể tăng lên để giúp người bệnh tống xuất đờm ra ngoài, giúp phổi thông thoáng và dễ thở hơn. Tình trạng ho sẽ giảm

**ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG - THUỐC NAM CỦA NGƯỜI VIỆT**

**dẫn trong các tuần sử dụng tiếp theo.**

- Để đạt hiệu quả cao trong điều trị, bệnh nhân cần kiên trì dùng thuốc đủ đợt.

- **Để phòng bệnh**, người bệnh nên uống dự phòng mỗi năm 4 - 6 tuần trước thời điểm giao mùa hoặc khi thấy trong người khó chịu.

**Chống chỉ định:**

Phụ nữ có thai, người tiểu đường.

**Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:**

Thận trọng khi dùng thuốc cho người tăng huyết áp.

**Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

**Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:**

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

**Tương tác, tương kỵ của thuốc:**

Hiện chưa có báo cáo nào về tương tác, tương kỵ của thuốc.

**Tác dụng không mong muốn:**

Cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy bất kì tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

**Quá liều và cách xử trí:**

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Hạn dùng của thuốc:**

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu, hoặc thấy hiện tượng gì lạ thì phải báo cho nhà sản xuất.

**Chú ý:**

Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng hết trong vòng 15 ngày. Vặn kín nắp chai sau mỗi lần sử dụng. Trường hợp pha loãng chế phẩm cần dùng hết ngay sau khi pha.

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C.

**Tiêu chuẩn:** TCCS

**Thông báo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ**

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**



**Nhà SX: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG**  
**Trụ sở:** số 96 - 98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội  
**Nhà máy GMP WHO:** CCN Thanh Oai, Hà Nội  
**Tel:** 024.33826222 \* **Fax:** 024.33978024  
[www.dongduocphuchung.com.vn](http://www.dongduocphuchung.com.vn)



**TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN CƯỚC**  
**1800.5454.35**  
(Trong giờ hành chính)

**ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG - THUỐC NAM CỦA NGƯỜI VIỆT**