

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

GMP - WHO

R_x Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Thuốc ho BỔ PHẾ CHỈ KHÁI LỘ

Để xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tên thuốc: Thuốc ho **BỔ PHẾ CHỈ KHÁI LỘ**

Thành phần hoạt chất

STT	Thành phần	Hàm lượng
1	Dịch chiết từ dược liệu Tương đương với:	60 ml
1.1	Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,9 g
1.2	Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,708 g
1.3	Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	3,25 g
1.4	Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radices</i>)	1,875g
1.5	Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	0,656 g
1.6	Thiên môn đông (<i>Radix Asparagi cochinchinensis</i>)	1,208 g
1.7	Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	1,666 g
1.8	Bán hạ (chế) (<i>Rhizoma Pinelliae</i>)	1,875 g
1.9	Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,591 g
1.10	Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	6,25 g
1.11	Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	1,406 g
2	Tinh dầu bạc hà (<i>Oleum Menthae arvensis</i>)	0,1 g
3	Phèn chua (<i>Alumen</i>)	0,208 g

Thành phần tá dược: Đường trắng, acid benzoic, ethanol 96%, nước tinh khiết vừa đủ 125ml.

Dạng bào chế: Chất lỏng sánh, màu nâu vàng, mùi thơm của tinh dầu bạc hà, vị ngọt cay.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125 ml.

Chỉ định:

Chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản.

Cách dùng và liều dùng: Ngày uống 3 lần

*Người lớn: Mỗi lần uống 1 thìa canh (15 ml).

* Trẻ em:

- Từ 30 tháng tuổi – 3 tuổi: Mỗi lần uống 1 thìa cà phê (5 ml).

- Từ 4 – 10 tuổi: Mỗi lần uống 2 thìa cà phê (10 ml).

- Từ 11 – 15 tuổi: Dùng theo liều người lớn

Đợt dùng từ 7 – 10 ngày.

Không dùng quá 4 tuần sau lần mở nắp đầu tiên.

Lưu ý: Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.

Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

- Bệnh nhân đái tháo đường

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Thận trọng ở người suy tim, tăng huyết áp. Thuốc này có chứa một lượng nhỏ ethanol, ít hơn 100mg/liều.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có báo cáo.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác của thuốc: Chưa có báo cáo.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại khi gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định thuốc.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng nếu thấy thuốc có hiện tượng đục, biến màu hoặc có những dấu hiệu khác lạ và báo ngay cho nhà sản xuất biết.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 02283.670733

Fax: 0228.3671098