

DAITICOL

Dung dịch nhỏ mắt

CÔNG THỨC: Cho 1 chai 10 ml

- Diphenhydramin hydroclorid 10 mg
- Kẽm sulfat 10 mg
- Tá dược: Natri tetraborat, Acid boric, Glycerin, Natri clorid, Nipagin, Nipasol, L - Menthol, Nước cất vừa đủ.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

DƯỢC LỰC HỌC:

- Kẽm sulfat có tác dụng sát khuẩn, dùng để sát trùng mắt.
- Diphenhydramin HCl là thuốc kháng histamin dùng để trị ngứa mắt, đỏ mắt.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Chưa có thông tin.

CHỈ ĐỊNH:

Dùng trong các trường hợp:

- Đỏ mắt, ngứa mắt, xốn mắt do tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm (nước hồ bơi, khói, bụi khi đi tàu xe...).
- Mỏi mắt, cay mắt do đọc nhiều, làm việc nhiều trên máy vi tính.
- Làm dịu mắt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Không dùng cho trẻ sơ sinh.
- Bệnh nhân tăng nhãn áp.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Có thể có cảm giác nóng tại chỗ nhưng sau đó hết ngay.
- Thuốc có thể gây giãn đồng tử dẫn đến nhìn lóa, nhìn mờ.
- Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THẬN TRỌNG:

Đậy kín sau khi dùng.

Tránh làm nhiễm bẩn đầu chai thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không ảnh hưởng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thận trọng vì thuốc có thể gây giãn đồng tử dẫn đến nhìn lóa, nhìn mờ.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có thông tin.

LIỀU DÙNG:

Nhỏ vào mắt 2 - 3 giọt mỗi lần, mỗi ngày nhỏ vài lần.

Chú ý: Không sử dụng thuốc sau khi mở nắp 15 ngày.

TRÌNH BÀY:

Hộp 01 chai đẹp 10 ml; Hộp 1 chai tròn 10 ml.


BẢO QUẢN:

Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Dung dịch nhỏ mắt DAITICOL đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Quận 2, TP. HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

601 Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 39770965 - 39770966 - 39770967 - 37422612 Fax: 39770968

Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com