



# GRISEOFULVIN 5%

## Kem bôi da

**CÔNG THỨC:** cho 1 tuýp 10g

Griseofulvin.....	0,5g
Tá dược vừa đủ .....	10g

(Vaselin, dầu paraffin, hydrogenated castor oil, sodium lauryl sulfate, glycerin, glyceryl monostearate, tinh dầu hoa hồng, ethanol 96%, nước tinh khiết).

**DƯỢC LỰC HỌC:**

- Griseofulvin là một kháng sinh kháng nấm, được tạo ra từ *Penicillium griseofulvum* hoặc từ các *Penicillium* khác. Tác dụng kháng nấm của griseofulvin trước hết là do phá vỡ cấu trúc thoi gián phân tế bào, nên làm ngừng pha giữa của phân bào. Một cơ chế tác dụng khác cũng được đề cập đến là griseofulvin tạo ra DNA khiếm khuyết không có khả năng sao chép. Griseofulvin đọng vào các tế bào tiền thân keratin tạo ra môi trường bất lợi cho nấm xâm nhập. Da, tóc và móng bị nhiễm bệnh sẽ được thay thế bằng các mô lành không bị nhiễm nấm.

- Griseofulvin ức chế phát triển các nấm da *Trichophyton* (đặc biệt là *T. rubrum*, *T. tonsurans*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. megninii*, *T. gallinae* và *T. schoenleinii*), *Microsporum* (như *M. audouinii*, *M. canis*, *M. gypseum*) và *Epidermophyton floccosum*.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Griseofulvin dạng kem bôi da có tác dụng kháng nấm tại chỗ.

**CHỈ ĐỊNH:**

Các bệnh nấm da, tóc, lông, móng tay, móng chân, kẽ tay, kẽ chân.

**CÁCH DÙNG:**

- Rửa sạch vùng bị nhiễm, lau khô, thoa thuốc 3 - 4 lần/ngày.

- Thời gian điều trị:

- \* Bệnh nấm da: dùng 1 - 3 tuần.
- \* Hăm ở các nếp và ở ngón chân: 2 - 4 tuần.
- \* Nấm tóc: 4 - 6 tuần.

- Trong đa số trường hợp, nên dùng phối hợp với điều trị bằng đường toàn thân (griseofulvin dạng viên).

- Trong thời gian điều trị, các biện pháp vệ sinh chung nên được giám sát để kiểm soát các nguồn gây nhiễm hay tái nhiễm.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

**THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:**

Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

**THẬN TRỌNG:**

- Tránh bôi lên mắt.

- Griseofulvin đôi khi gây phản ứng mẫn cảm với ánh sáng, nên trong thời gian dùng thuốc, người bệnh cần tránh phơi nắng. Phản ứng mẫn cảm với ánh sáng có thể làm nặng thêm bệnh lupus ban đỏ.

- Thuốc có nguồn gốc từ các loài *Penicillium*, nên có khả năng dị ứng chéo với penicillin.

- Khi bôi griseofulvin trên diện rộng hay ở trẻ còn bú, thuốc có thể bị hấp thu toàn thân.

**TÁC DỤNG PHỤ:**

- Có thể có phản ứng tại chỗ (kích ứng hay nhạy cảm).

- Thường gặp: nổi mề đay, phát ban do mẫn cảm với ánh sáng, ban đỏ đa dạng, ban dạng mụn nước hoặc dạng sởi,...

- Ít gặp: phản ứng giống bệnh huyết thanh, phù mạch,...

- Ngừng sử dụng thuốc và thông báo cho bác sỹ biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

- Sử dụng griseofulvin trên diện rộng: cần thận trọng khi phối hợp với rượu, phenobarbital, thuốc chống đông nhóm coumarin, thuốc tránh thai dạng uống, theophylline, aspirin, cyclosporine.

- Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

**QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:**

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

**HẠN DÙNG:**

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

**BẢO QUẢN:**

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**TRÌNH BÀY:**

Tuýp 10g. Hộp 1 tuýp.

Sản xuất theo TCCS

**Để xa tầm tay trẻ em.**  
**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**  
**Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.**  
**Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ.**

Sản xuất tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
297/5 Lý Thường Kiệt - Q. 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam