

<https://vnras.com/drug/>  
Nêu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

## HEMIFERE

(Viên nén nhai chứa sắt và acid folic)

### THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén nhai có chứa:

**Hoạt chất:** phức hợp sắt III hydroxide polymaltose tương đương với sắt nguyên tố 100mg, acid folic 350mcg.

**Tá dược:** Bột sorbitol, aspartame, kollidon CL-M, avicel pH 102, bột hương vị sô cô la, magnesium stearate.

### CHỈ ĐỊNH

- Phòng và điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt và acid folic
- Điều trị tình trạng thiếu sắt và acid folic ở phụ nữ có thai, cho con bú khi thức ăn không cung cấp đủ.
- Cơ thể kém hấp thu sắt: Cát đoạn dạ dày, viêm teo niêm mạc dạ dày, viêm ruột mãn tính.
- Chứng xanh lợt ở thiếu nữ và phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Nhai nát viên thuốc trước khi chiêu với một cốc nước.

**Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:**

Bổ sung chế độ ăn: 1 viên/ ngày. Đợt điều trị khoảng 8-12 tuần.

Điều trị: 1 viên/lần x 3 lần/ngày

Phụ nữ khi biết có thai uống 1 viên /ngày, đều đặn suốt thời gian mang thai cho đến một tháng sau đẻ. Phụ nữ từ 15 - 30 tuổi (không có thai) uống mỗi tuần một viên.

**Trẻ em dưới 12 tuổi:** dạng viên nén nhai không phù hợp cho trẻ em dưới 12 tuổi. Nên dùng dạng si rô hoặc thuốc nhỏ giọt

*Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.*

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Bệnh gan nhiễm sắt
- Thiếu máu tan máu
- Bệnh đa hồng cầu.
- Trẻ em dưới 12 tuổi

### NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC

Không sử dụng sắt để điều trị thiếu máu tan huyết trừ trường hợp cũng bị tình trạng thiếu sắt. Không nên dùng thuốc cho những bệnh nhân thường xuyên được truyền máu, vì trong hemoglobin của hồng cầu được truyền có một lượng sắt đáng kể.

Acid folic nên được dùng thận trọng cho những bệnh nhân bị thiếu máu chưa được chẩn đoán vì có thể làm che lấp triệu chứng thiếu máu ác tính đưa đến tiến triển những biến chứng thần kinh.

### TƯƠNG TÁC THUỐC

Thuốc làm giảm hấp thu cycilin (Tetracyclin, Doxycylin,...). Các thuốc kháng acid làm giảm hấp

thu sắt. Không nên uống nước trà khi dùng thuốc

### SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thuốc được khuyến dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

### ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

### TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Có thể có rối loạn tiêu hoá nhẹ. Phân có màu đen là tình trạng bình thường khi sử dụng thuốc này.

**Ghi chú:** XIN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ CÁC TÁC DỤNG NGOẠI Ý GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC

### SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Thành phần sắt trong viên nén nhai Hemifere ở dạng phức hợp sắt III polymaltose là cấu trúc đại phân tử của nhiều nhân sắt III hydroxyd và phân tử dextrin thủy phân (polymaltose), có khả năng kiểm soát tốt sự hấp thu qua màng tế bào, sử dụng an toàn, tránh được nguy cơ quá liều so với sản phẩm có chứa sắt vô cơ. Chưa có ghi nhận về độc tính của acid folic khi dùng quá liều, vì acid folic tan trong nước nên nếu uống dư thừa sẽ được cơ thể loại ra theo nước tiểu.

### TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Nhà sản xuất

### HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ THỜI HẠN GHI TRÊN NHÃN**

### BẢO QUẢN

Giữ thuốc ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng  
**GIỮ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM**

### TRÌNH BÀY

Hộp 1 vi x 10 viên nén nhai

Hộp 3 vi x 10 viên nén nhai

### NHÀ SẢN XUẤT

The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Limited.

Kalalwala, 20Km Lahore-Jaranwala Road, Pakistan.



Manufactured by:

**The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Limited.**

Kalalwala, 20 Km Lahore - Jaranwala Road, Pakistan.  
[www.schazoo-spl.com](http://www.schazoo-spl.com)